

# Hoja informativa de Velphoro

## Usted decide cómo tomar Velphoro

Tome siempre Velphoro con las comidas.

**No lo ingiera entero.** Velphoro es fácil de partir, masticar o triturar. Tómelo justo antes, durante o justo después de las comidas o los refrigerios.

Si olvidó tomar una dosis, tome su dosis habitual de Velphoro con su próxima comida.



PARTIR



MASTICAR



TRITURAR

Alivie su día  
a la manera  
de Velphoro



## Su dosis de Velphoro

TOME: \_\_\_\_\_  
COMPRIMIDOS POR: COMIDA  DÍA   
(encierre en un círculo una opción)



VS.



Debido a que Velphoro es un quelante de fosfato más fuerte, **es probable que usted tenga que tomar menos comprimidos en comparación con otros quelantes de fosfato.** La mayoría de las personas comienzan con 1 comprimido por comida. Con otros quelantes, podría necesitar tomar hasta 3 o 4 comprimidos con cada comida.

## INDICACIÓN

Velphoro® (oxihidróxido sucroférico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis.

Consulte la Información importante de seguridad al dorso y la Información de prescripción completa en [velphoro.com](http://velphoro.com).

 **VELPHORO**®  
(sucroferric oxyhydroxide)  
chewable tablets

# Consejos para ayudarlo a recordar que debe tomar Velphoro



Lleve siempre Velphoro con usted en un pastillero de Velphoro.\*



Conserve Velphoro en la mesa de la cocina o la encimera.



Pegue recordatorios en la puerta del refrigerador y la puerta principal.

\*Mantenga el frasco o el pastillero de Velphoro bien cerrado. Guarde a temperatura ambiente y por debajo de los 87 °F (30.5 °C).

La mayoría de los efectos secundarios de Velphoro son leves. Los más frecuentes son la diarrea o las heces blandas, que suelen aparecer en la primera semana de tratamiento y desaparecen por sí solas al poco tiempo.

El hierro en Velphoro puede hacer que sus heces se vuelvan negras. Esto es lo que se espera.

**Si tiene alguna pregunta, su equipo de atención está disponible para ayudarlo.**

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los tome enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.
- Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro, y su proveedor de atención médica controlará sus niveles de hierro mientras tome Velphoro.

- Velphoro puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece. Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la administración de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o visite [www.fda.gov/medwatch](http://www.fda.gov/medwatch).
- Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está dando de lactar.

**Velphoro solo está disponible con receta. Para más información, vea la información de prescripción completa en [www.velphoro.com](http://www.velphoro.com).**