

¿Cree que toma demasiados comprimidos para controlar el nivel de fósforo?

El control del nivel de fósforo no es fácil, pero un quelante de fosfato más potente podría ayudar.

Más fuerte

para que pueda tomar menos comprimidos en comparación con otros quelante de fosfato.



VELPHORO

VS.



EL QUELANTE RECETADO
CON MAYOR FRECUENCIA

Más formas de tomarlos

Dosis inicial recomendada:

1 comprimido por comida. Tómelo como se indica, justo antes, durante o justo después de cada comida o refrigerio.



PARTIR



MASTICAR



TRITURAR

Alivie su día
a la manera
de Velphoro



Qué esperar

- Los efectos secundarios de Velphoro son en su mayoría leves.
- Los más frecuentes son la diarrea o las heces blandas, que suelen aparecer en la primera semana de tratamiento y desaparecen por sí solas al poco tiempo.
- El hierro que contiene Velphoro puede hacer que sus heces se vuelvan de color negro. Esto es esperable con los medicamentos que contienen hierro.

Hable con su equipo de atención médica sobre Velphoro

INDICACIÓN

Velphoro® (oxihidróxido sucroférico) es un quelante de fosfato indicado para el control de los niveles de fósforo sérico en pacientes con enfermedad renal crónica en tratamiento con diálisis.

Consulte la Información importante de seguridad al dorso
y la Información de prescripción completa en velphoro.com.

 **VELPHORO**®
(sucroferric oxyhydroxide)
chewable tablets

Preguntas para su equipo de atención

Su equipo de atención le recomienda que tome Velphoro, un quelante de fosfato. Pero es posible que tenga preguntas como:

- 1 ¿Por qué se me cambia a un quelante de fosfato diferente?
- 2 ¿En qué se diferencia Velphoro de mi último quelante de fosfato?
- 3 Si tengo efectos secundarios, ¿cuánto tiempo durarán?
- 4 ¿Por qué tomo menos pastillas de las que solía tomar?
- 5 ¿Es Velphoro asequible?



Visite el Centro de vídeos de velphoro.com para obtener más información

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Los comprimidos masticables Velphoro se deben tomar con las comidas. Velphoro se debe masticar o triturar. No los tome enteros. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con y sin receta, vitaminas y otros suplementos. Velphoro puede interactuar con otros medicamentos.
- Informe a su proveedor de atención médica si sufre de alguno de los siguientes: peritonitis (una infección) durante la diálisis peritoneal, trastornos hepáticos o gástricos significativos, cirugía gastrointestinal (GI) importante y reciente, antecedentes de hemocromatosis u otra enfermedad que tenga como resultado una acumulación de hierro en el cuerpo. Las personas con estas afecciones no fueron incluidas en los estudios clínicos con Velphoro, y su proveedor de atención médica controlará sus niveles de hierro mientras tome Velphoro.

- Velphoro puede causar efectos secundarios. Los efectos secundarios más frecuentes son cambio de color de las heces, diarrea y náuseas. Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparece. Para reportar efectos secundarios negativos asociados con la administración de Velphoro, comuníquese con Fresenius Medical Care North America (FMCNA) al 1-800-323-5188. Se le recomienda reportar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al 1-800-FDA-1088 o visite www.fda.gov/medwatch.
- Antes de tomar Velphoro, informe a su médico si está embarazada, planea quedar embarazada o está dando de lactar.

Velphoro solo está disponible con receta. Para más información, vea la Información de prescripción completa en www.velphoro.com.